

EL OLIVO

Las Soluciones Agrobiológicas de Opennatur

Las plagas

Dacus oleae
(Mosca del olivo)



Prays oleae
(Polilla del olivo)




Palpita unionalis
(Glifodes)



Euzophera pinguis
(Abichado del olivo)



Zeuzera pirina
(Taladro de la madera)



Las feromonas

Atracción de machos.
Seguimiento del vuelo.
Duración de la feromona:
45, 90 y 180 días.

Atracción de machos.
Seguimiento del vuelo.
Duración de la feromona: 45
días.

Atracción de machos.
Seguimiento del vuelo.
Duración de la feromona: 45
días.

Trampa captura masiva.
8 trampas / Ha.
Seguimiento del vuelo.
Duración de la feromona: 45
días.

Atracción de machos.
Seg. del vuelo: 45 días.


Trampa captura masiva.
6-8 trampas / Ha.
Seguimiento del vuelo
Duración de la feromona: 45
días.

Las trampas

**Placa Cromática
Amarilla
Rígida**




Trampa Delta



Trampa Funnel Unitrap



Trampa Supercare Z



Juli Cèsar, 3
25003 Lleida
Tel. 973 28 93 09
Fax 973 26 70 72
info@opennatur.com

<http://www.opennatur.com>

