

MORRUT DE LES PALMERES

Rhynchophorus ferrugineus

La plaga

Adults: coleòpters de 2 a 5 cm. de color vermellós i morro allargat. Taques rodones fosques al tòrax. Línees negres a les ales.

Larves: es desenvolupen a l'interior de la palmera i poden arribar a superar els 5 cm.

Lluita

DETECCIÓ DE PALMERES INFESTADES
CAPTURA MASSIVA
MONITORATGE



Adult de *Rhynchophorus ferrugineus*



Larva de *Rhynchophorus ferrugineus*



Pupa de *Rhynchophorus ferrugineus*

MONITORATGE

Hauria de col·locar-se **ràpidament** un dispositiu de trampeig per efectuar el monitoratge de la zona afectada. Aquest dispositiu permetrà **detectar nous focus** de manera complementària a la inspecció visual

INSTRUCIONS PER AL MONITORATGE

- Col·locar una trampa per cada 3 ha de cultiu o per cada zona monitorada.
- Col·locar la trampa semienterrada al sòl (fins als orificis laterals).
- Col·locar la trampa en una zona amb ombra (fora del sol directe).
- Col·locar la feromona a l'interior de la trampa, enganxada a la part inferior de la tapa amb la membrana difusora mirant al fons de la trampa o penjada de la tapa, sense tocar la zona d'emissió i amb guants.
- Suspensa de la tapa es col·loca també el difusor d'acetat d'etil.
- Col·locar a l'interior de la trampa un recipient més petit que contingui aigua amb dàtils, margalló, canya de sucre, etc. amb l'objectiu que fermenti. S'ha de mantenir la fermentació activa (afegint aigua si és precís o renovant parcial o totalment el material quan sigui necessari).
- Col·locar insecticida a l'interior per provocar la mort de l'insecte (es pot substituir per emplenar el fons de la trampa amb aigua i sabó)
- Col·locar la trampa allunyada de les palmeres sensibles (*Phoenix canariensis* i *dactilífera*). Si la trampa s'ha d'instal·lar pròxima a palmeres, encara que siguin poc sensibles, es recomana efectuar un tractament preventiu al tronc d'aquestes amb algun insecticida autoritzat residual (diazinó microencapsulat o fenitrotió microencapsulat, repetir el tractament un cop al mes).
- Les trampes es controlaran **1 cop a la setmana**, per recollir i anotar el número de morruts capturats, comprovar que segueixin ben col·locades, i emplenar si fos necessari l'aigua del recipient i del fons. És important mantenir la humitat a l'interior de la trampa.
- Els atraients s'han de renovar cada **6 setmanes**.

El monitoratge es realitzarà durant tot l'any, ja que els adults poden sortir durant tot aquest temps, però els períodes més importants son els compresos entre **Abril i Novembre**.

Juli Cèsar, 3
25003 Lleida
Tel. 973 28 93 09
Fax 973 26 70 72
info@opennatur.com

<http://www.opennatur.com>

