

# PICUDO ROJO DE LA PALMERA

*Rhynchophorus ferrugineus*

## La plaga

**Adultos:** coleópteros de 2 a 5 cm. de color rojizo y pico alargado. Manchas redondas oscuras en el tórax. Líneas negras en las alas.

**Larvas:** se desarrollan en el interior de la palmera y pueden llegar a superar los 5 cm.

## Lucha

DETECCIÓN DE PALMERAS INFESTADAS  
CAPTURA MASIVA  
MONITOREO



Adulto de *Rhynchophorus ferrugineus*



Larva de *Rhynchophorus ferrugineus*



Pupa de *Rhynchophorus ferrugineus*

### MONITOREO

Deberá colocarse **lo antes posible** un dispositivo de trapeo para efectuar el monitoreo de la zona afectada. Este dispositivo permitirá **detectar nuevos focos** de manera complementaria a la inspección visual

### INSTRUCCIONES PARA EL MONITOREO

- Colocar una trampa por cada 3 ha de cultivo o por cada zona monitoreada.
- Colocar la trampa semienterrada en el suelo (hasta los orificios laterales).
- Colocar la trampa en una zona sombreada (fuera del sol directo).
- Colocar la feromona en el interior de la trampa, pegada en la parte inferior de la tapa con la membrana difusora mirando al fondo de la trampa o colgada de la tapa, sin tocar la zona de emisión y con la protección de guantes.
- Suspendida de la tapa se coloca también el difusor de acetato de etilo.
- Colocar en el interior de la trampa un recipiente más pequeño que contenga agua más dátiles, palmito, caña de azúcar, etc. con el objetivo de que fermente. Se debe mantener la fermentación activa (añadiendo agua si es preciso o renovando parcial o totalmente el material cuando sea necesario).
- Colocar el insecticida en el interior para provocar la muerte del insecto (se puede sustituir por llenar el fondo de la trampa con agua + jabón)
- Colocar la trampa alejada de las palmeras sensibles (*Phoenix canariensis* y *dactilifera*). Si la trampa se ha de instalar cerca de palmeras, aunque sean poco sensibles, se recomienda efectuar un tratamiento preventivo en el tronco de las mismas con algún insecticida autorizado residual (diazinón microencapsulado o fenitrotión microencapsulado y repetir el tratamiento una vez al mes).
- Las trampas se controlarán **1 vez por semana**, para recoger y anotar el número de picudos capturados, comprobar que siguen bien colocadas, y completar si es necesario el agua del recipiente y del fondo. Es importante mantener la humedad en el interior de la trampa.
- Los atrayentes se deben renovar cada **6 semanas**.

El monitoreo se realizará durante todo el año, dado que los adultos pueden salir durante todo este tiempo, pero los periodos más importantes son los comprendidos entre **Abril y Noviembre**.

Juli Cèsar, 3  
25003 Lleida  
Tel. 973 28 93 09  
Fax 973 26 70 72  
info@opennatur.com

<http://www.opennatur.com>

